

METADONA CLORHIDRATO LIF

Metadona Clorhidrato 5 mg
Metadona Clorhidrato 10 mg

INFORMACION PARA EL PACIENTE



Comprimidos

Estupeciente Lista I

Lea la información para el paciente antes de tomar Metadona y cada vez que reciba una nueva receta. Este folleto no reemplaza la consulta con su médico. Comparta la información importante en este prospecto con los miembros de su grupo familiar. Si tiene alguna duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Los comprimidos de Metadona Clorhidrato LIF son blancos y ranurados, sin colores, sin abolladuras ni roturas. Si alguno de los comprimidos que usted posee no cumple con estas características no lo consuma. Comuníquese con el Laboratorio al teléfono 342-4827360 o 342-4579231, Directora Técnica Ma. Cecilia Selis.

¿Qué es Metadona LIF?

Metadona Clorhidrato LIF es un medicamento recetado que contiene metadona, que es agonista opiáceo para el dolor, similar a la morfina.

Metadona Clorhidrato LIF se utiliza:

- Para tratar el dolor moderado a severo en personas que no responden al dolor con medicamentos distintos a los opioides.
- Para tratar el dolor intenso de cualquier etiología.
- Para el tratamiento sustitutivo de mantenimiento a opiáceos, dentro de un programa de mantenimiento con control médico y conjuntamente con medidas de tipo médico y psicosocial.
- Para el tratamiento del síndrome de abstinencia a los narcóticos.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de Metadona Clorhidrato LIF? ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles?

Metadona Clorhidrato LIF puede causar problemas respiratorios potencialmente mortales que pueden conducir a la muerte. Estos problemas son más probables que ocurran cuando alguien que no tome opioides ingiere este medicamento.

Los problemas respiratorios pueden suceder un tiempo después de haber tomado la dosis.

Las reacciones adversas más frecuentes son: hipotensión, mareo, alteraciones visuales, sedación, náuseas, vómitos, boca seca, estreñimiento. Es muy importante que se tome Metadona Clorhidrato LIF exactamente como su médico le ha recetado.

Hable con su médico acerca de su dolor. Su médico puede decidir si necesita modificar su tratamiento.

Dispensa Bajo Receta Oficial Archivada

¿Qué debo decirle a mi médico antes de comenzar a tomar Metadona Clorhidrato LIF?

Antes de iniciar Metadona Clorhidrato LIF, dígame a su médico acerca de todas sus condiciones médicas y mentales, incluyendo un historial de abuso de drogas, alcohol, adicción y todo otro medicamento que esté tomando.

¿Cómo debo tomar Metadona LIF?

- Tome Metadona Clorhidrato LIF exactamente según lo indicado por su médico. No cambie su dosis a menos que su médico se lo indique. No tome una dosis mayor de Metadona Clorhidrato LIF, ni tampoco más seguido que lo prescrito. Esto puede llevar a una sobredosis y posiblemente serias complicaciones que en algunos casos pueden producir la muerte.
- Informe a todos los profesionales de la salud que lo atiendan que usted toma Metadona Clorhidrato LIF.
- Hable con su médico regularmente para determinar si todavía necesita Metadona Clorhidrato LIF, o si la dosis debe ser ajustada.

Advertencia:

No tome una dosis mayor o modifique la frecuencia a la indicada por el médico. Esto puede producir una sobredosis y posible muerte.

La depresión respiratoria es el principal riesgo asociado con la administración de metadona.

Se recomienda monitorizar cuidadosamente al paciente con antecedentes de alteraciones de la conducción cardíaca que empleen metadona.

Ansiedad: La Metadona no es un ansiolítico y no es eficaz en el tratamiento de la ansiedad generalizada.

Utilizar con precaución en pacientes hipotensos.

Uso en deportistas: este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado positivo en las pruebas de control del dopaje.

Dolor abdominal: La administración de Metadona u otros opioides puede enmascarar el diagnóstico y el curso clínico de los pacientes con abdomen agudo.

¿Quiénes no deben tomar Metadona LIF?

Contraindicaciones

- Pacientes que posean hipersensibilidad al clorhidrato de metadona o a cualquier otro ingrediente en Metadona Clorhidrato LIF.
- Pacientes con depresión respiratoria
- Insuficiencia respiratoria.
- Enfisema.

- Asma bronquial.
- Cor pulmonale.
- Pacientes con infarto agudo miocárdico.
- Hipercapnia.
- Pacientes que sufran o se sospeche de íleo paralítico.
- Hipertrofia prostática o estenosis uretral.
- Hipertensión craneal.

Interacciones medicamentosas

Consulte a su médico si está tomando: buprenorfina, pentazocina, naltrexona, Abacavir, amprevir, efavirenz, nelfinavir, nevirapina, ritonavir, lopinavir y ritonavir, Didanosina, Estavudina, Zidovudina, Rifampicina, Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina, ketoconazol, eritromicina, sertralina, fluvoxamina, Voriconazol, meperidina.

Antiartríticos, antidepresivos tricíclicos, hipnóticos y otros fármacos sedantes del sistema nervioso central, bloqueantes de los canales de calcio y antihistamínicos (como la difenhidramina). Otros analgésicos opioides, anestésicos generales, fenotiazinas, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos u otros depresores del SNC (incluyendo el alcohol).

Interrupción del tratamiento con Metadona Clorhidrato LIF:

- Pregúntele a su médico para obtener instrucciones sobre cómo suspender la toma de este medicamento lentamente para evitar síntomas molestos. Usted no debe dejar de tomar Metadona Clorhidrato LIF sin consultar a su médico previamente.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita.

¿Qué debo evitar mientras esté tomando Metadona Clorhidrato LIF?

- No conduzca ni maneje máquinas, Metadona LIF puede producir somnolencia y disminuir la capacidad de atención.
- No beba alcohol mientras esté usando Metadona Clorhidrato LIF. Se puede aumentar la probabilidad de tener efectos secundarios peligrosos.
- No tome otros medicamentos con Metadona Clorhidrato LIF sin antes consultar con su médico.

Recomendaciones:

- Llame a su médico o busque atención médica de inmediato si tiene: dificultad para respirar, somnolencia extrema y la respiración se ralentiza, respiración superficial lenta (poco movimiento del pecho al respirar), pulso cardíaco rápido o lento. Si se siente débil, muy mareado, confundido, tiene palpitaciones (latidos del corazón irregulares) o cualquier otro síntoma inusual.
- Estos pueden ser síntomas de que ha tomado una dosis alta de Metadona Clorhidrato LIF. Estos síntomas pueden conducir a problemas graves o a la muerte si no se trata de inmediato.

• Metadona Clorhidrato LIF puede causar que su presión arterial baje. Esto puede hacer que se sienta mareado si se levanta demasiado rápido después de estar sentado o acostado.

• Metadona Clorhidrato LIF puede causar dependencia física. No deje de tomar Metadona Clorhidrato LIF o cualquier otro opiáceo sin antes consultar con su médico. Usted podría presentar síntomas de abstinencia porque su cuerpo se ha acostumbrado a estos medicamentos. Hable con su médico acerca de ir reduciendo gradualmente la dosis de Metadona Clorhidrato LIF.

• Para los pacientes que utilizan Metadona Clorhidrato LIF para el tratamiento del dolor, existe la posibilidad de abuso o adicción con Metadona Clorhidrato LIF. La posibilidad es mayor si usted es o ha sido adicto o ha abusado de otros medicamentos, drogas ilegales o alcohol, o si usted tiene antecedentes de problemas mentales.

• Algunos efectos secundarios comunes de Metadona Clorhidrato LIF son aturdimiento, mareos, somnolencia, náuseas, vómitos y sudoración. Otros efectos secundarios incluyen debilidad, dolor de cabeza, estreñimiento, picazón y sequedad de boca, entre otros.

• Hable con su médico acerca de cualquier efecto secundario.

¿Cómo debo almacenar Metadona Clorhidrato LIF?

- Mantenga siempre Metadona Clorhidrato LIF en un lugar seguro para proteger contra el robo.
- Vender o regalar este medicamento es peligroso y contra la ley.
- Nunca le dé Metadona Clorhidrato LIF a nadie más, aunque tenga los mismos síntomas que usted. Puede perjudicar e incluso causar la muerte.

Conservación:

Conservar a temperatura ambiente controlada entre 15 °C a 30 °C. Proteger de la luz.

MANTENER ESTE Y TODO MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER CONSULTA, RECLAMO O NOTIFICACIÓN DE POSIBLES EFECTOS ADVERSOS COMUNICARSE POR VÍA TELEFÓNICA 0342-4827360,

VÍA EMAIL A LA DIRECCIÓN: farmacovigilancia.lif@santafe.gov.ar

O AL PROGRAMA PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE POR VÍA TELEFÓNICA 0342-4573710/13

O VÍA EMAIL A LA DIRECCIÓN farmacovigilancia_dbyfcia@santafe.gov.ar

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SE

French 4950 Pcia.de Santa Fe CP:3000 Tel./Fax: 0342-4579233/31

Dirección Técnica: Farm. María Cecilia Selis. Matrícula Nacional N°: 12.024

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N°:57.473

Fecha de la última revisión autorizada por ANMAT: 03/2020